



Paprasti išmintingi sprendimai

VIETINIAI ANESTETIKAI IR ADATOS IŠ INIBSA (ISPANIJA)

NAUJIENA!!!



MONOPROTECT dantalinės adatos

- Nerūdijančio plieno kaniulės, silikonu padengtas galiukas
- Trigubas nuolydis – lengvesnė audinių penetracija, mažą audinių pažeidimo tikimybę
- Nuolydžio indikatorius leidžiai teisingai pozicionuoti adatą
- Sudėtyje nėra latekso – mažą alerginių reakcijų ir odos sudirginimo tikimybę
- Sterilumo garantija. Apsauginis dangtelis ir saugiklis sujungti suvirinta jungtimi
- Spalvinis žymėjimas. To paties dydžio adatos supakuotos dėžutėse po 100 vnt.
- Greitas įvertinimas. Produkto partija, galiojimo laikas ir dydis nurodytas ant adatos dangtelio
- Pagaminta ES

Švelni injekcija – komfortas pacientui

DENTOCAINE (1.8 ml karpulė) (Inibsa, Ispanija)

Veikliosios medžiago: Artikainas (4%):

- Mažas toksiskumas (dėka didelio susirišimo su plazmos baltymais – 94%, metabolizmo per plazmą ir kepenis, labai trumpo pusinės eliminacijos periodo - tik 20 minučių)
- Efektyvesnis, greičiau pradeda veikti (dėka didelio tirpumo riebaluose)

Epinefrinas (1:100 000 arba 1:200 000 - 0,018 arba 0,009 mg karpulėje):

- Sumažina kraujavimą ir seilėtekį
- Sulauko anestetiką švirkštimo vietoje (neleidžia pasišalinti iš poveikio vietos bei pasklisti po visą kūną)
- Padidina ir prailgina anestetiko poveikį

DENTOCAINE išskirtinumas:

1. Mažesnė kaina
2. Daugiau anestetiko vienoje karpulėje – 1.8 ml
3. Karpulės stūmoklis tinka įvairiems aspiraciniams švirkštams: "harpūno formos švirkšto stūmoklis", "spyglio formos švirkšto stūmoklis", "kamščiatraukio formos švirkšto stūmoklis", "plokščias švirkšto stūmoklis"



Dentocaine (epinefrino koncentracija 1:200000) – skirtas eilinėms vidutinio sudėtingumo procedūroms, rekomenduojamas kaip pirmasis pasirinkimas odontologo kabinete

Dentocaine (epinefrino koncentracija 1:100000) – skirtas sudėtingesnėms procedūroms, kai reikia ilgesnio veikimo laiko bei didesnės kraujavimo kontrolės

VEIKIMO TRUKMĖ	MINUTĖS
Veikimo pradžia	2
Pulpos nejautros laikas	45-60
Minkštųjų audinių nejautros laikas	120-300

VEIKIMO TRUKMĖ	MINUTĖS
Veikimo pradžia	2
Pulpos nejautros laikas	60-75
Minkštųjų audinių nejautros laikas	180-360